


了解十年的破碎風險 (婦女) 加拿大



[Click here for CAROC risk assessment in table format.](#)

Papaioannou A, et al. *CMAJ* 2010 Oct 12. [Epub ahead of print].

40 岁之后的脆性骨折或者近期的持久性系统使用糖皮质激素增加了一个等级的 CAROC 基本风险（即：从低度风险到中度风险，或者从中度风险到高度风险）。有过脊椎脆性骨折或者髌部脆性骨折的个人以及那些已经有过多余一种的脆性骨折的个人在发生额外骨折风险上属于高度风险等级。

上述图表中的大腿骨颈位的数据源自于国家健康及营养教育调查 3（NHANES III）的针对白人妇女的数据库。

妇女十年骨折风险评估（CAROC 基本风险）

年齡	低风险	中度风险	高风险
Age	Low Risk	Moderate Risk	High Risk
50	above -2.5	-2.5 to -3.8	below -3.8
55	above -2.5	-2.5 to -3.8	below -3.8
60	above -2.3	-2.3 to -3.7	below -3.7
65	above -1.9	-1.9 to -3.5	below -3.5
70	above -1.7	-1.7 to -3.2	below -3.2
75	above -1.2	-1.2 to -2.9	below -2.9
80	above -0.5	-0.5 to -2.6	below -2.6
85	above +0.1	+0.1 to -2.2	below -2.2

The T-score for the femoral neck is derived from the National Health and Nutrition Education Survey III (NHANES III) reference database for white women.

上述图表中的大腿骨颈位的数据源自于国家健康及营养教育调查 3（NHANES III）的针对白人妇女的数据库。